

Starane Forte			
Plodina, indikace	Dávkování	Aplikace	Měsíc(e)
Ječmen, Plevel dvouděložné - OL=AT. Aplikace se provádí na jaře od fáze odnožování do fáze druhé ko kolénka. Na vzešlé plevel. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Jílek, Plevel dvouděložné - OL=7. Plevel dvouděložný, jednotelý. Aplikujte od března do září od fáze 3 listů trav (13 BBCH). Aplikujte na vzešlé plevel, hubí i jeteloviny. OL se vztahuje na sečení, silážování a spásání. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Oves, Plevel dvouděložné - OL=AT. Aplikace se provádí na jaře od fáze odnožování do fáze druhé ko kolénka. Na vzešlé plevel. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Travník, Plevel dvouděložné - OL=AT. Plevel dvouděložný, jednoletý. Aplikujte od března do září od fáze 3 listů trav (13 BBCH). Hubí i jetele. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Tritikale, Plevel dvouděložné - OL=AT. Aplikace se provádí na jaře od fáze odnožování do fáze druhé ko kolénka. Na vzešlé plevel. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Žito, Plevel dvouděložné - OL=AT. Aplikace se provádí na jaře od fáze odnožování do fáze druhé ko kolénka. Na vzešlé plevel. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9

Kukuřice, Plevel dvouděložné - OL=AT. Aplikujte od fáze dvou pravých listů do fáze šesti pravých listů kukuřice (12-16 BBCH). Nesmí se aplikovat, pokud noční teploty klesnou pod 6 st. C. Přípravek může způsobit mírné přechodné zbrzdění růstu kukuřice. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m2	Postřik	4,5,6,7,8,9
Louky, Plevel dvouděložné - OL=7. Plevel dvouděložné, jednatelé. Aplikujte od března do září od fáze 3 listů trav (13 BBCH). Aplikujte na všechné plevele, hubí i jeteloviny. OL se vztahuje na sečení, silážování a spásání. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m2	Postřik	4,5,6,7,8,9
Nezemědělská půda, Plevel dvouděložné - OL=AT. Aplikujte od března do září na aktivně rostoucí plevele. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m2	Postřik	4,5,6,7,8,9
Pšenice, Plevel dvouděložné - OL=AT. Pšenice špalda. Aplikace se provádí na jaře od fáze odnožování do fáze druhé ko kolénka. Na všechny plevele. Max. 1x za vegetaci.	6 ml / 4 l / 100 m2	Postřik	4,5,6,7,8,9