

VitiSan			
Plodina, indikace	Dávkování	Aplikace	Měsíc(e)
Angrešt, Americké padlí angreštové - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 8x za vegetaci v intervalu 7-10 dnů.	50 g / 10 l vody	Postřik	4,5,6
Čekanka, Padlí - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 10x za vegetaci v intervalu 5-7 dnů.	3 g / 6 l vody / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8
Drobné ovoce, Americké padlí angreštové - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 8x za vegetaci v intervalu 7-10 dnů.	50 g / 10 l vody	Postřik	4,5,6
Tykev, Padlí - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 6x za vegetaci v intervalu 7-10 dnů.	15-30 g / 6-12 l vody / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Jabloň, Strupovitost - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 6x za vegetaci v intervalu 8-10 dnů.	75 g / 10 l vody	Postřik	5,6,7,

Jahoda, Padlí - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 8x za vegetaci v intervalu 7-10 dnů.	30 g / 5-10 l vody / 100 m ²	Postřik	5,6,7,8,9
Kořeninové rostliny a koření, Padlí - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 6x za vegetaci v intervalu 7-10 dnů.	30 g / 4-6 l vody / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Kozlíček polníček, Padlí - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 10x za vegetaci v intervalu 5-7 dnů.	3 g / 6 l vody / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8
Okrasné rostliny, Padlí - OL= AT. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 10x za vegetaci v intervalu 7-10 dnů (venkovní prostory) a 5-7 dnů (chráněné prostory).	30 g / 10-20 l vody / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Rajčata, Padlí - OL= 1. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 6x za vegetaci v intervalu 7-10 dnů.	15-30 g / 6-12 l vody / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Réva vinná, Padlí révové - OL= AT. Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Max. 6x za vegetaci v intervalu 3-7 dnů.	75 g / 10 l vody	Postřik	5,6,7

Réva vinná, Plíseň šedá - OL= AT.

Aplikace postřikem nebo rosením ihned po oschnutí listů, nejpozději však do 48 hod. od počátku infekce (choroby). Ošetřuje se pouze zóna hroznů. Max. 6x za vegetaci v intervalu 3-7 dnů.

200 g / 10 l
vody

Postřik

5,6,7,8,9