

INPORO Kelik K-Si			
Plodina, indikace	Dávkování	Aplikace	Měsíc(e)
Brambor, Odolnost - Postřik brambor od půlky vegetace před nebo v době výskytu plísní bramborové nebo před rizikem předčasného polehu natí brambor. Postřik 1x za vegetaci.	5 - 10 ml / 10 l vody / 100 m ²	Postřik	5,6
Cukrovka, Odolnost - Postřik řepy v půlce vegetace. 1x za vegetaci.	5 - 10 ml / 10 l vody / 100 m ²	Postřik	5,6,7
Hrách, Odolnost - Postřik hrachu, luskovin od půlky vegetace před nebo v době výskytu plísní. Postřik 1 x za vegetaci.	5 - 10 ml / 10 l vody / 100 m ²	Postřik	5,6
Ovocné dřeviny, Odolnost - Postřik ovocných stromů rostlin v době po odkvětu před nebo v době výskytu strupovitosti, houbových chorob na listech. Max. 2x za vegetaci.	5 - 10 ml / 10 l vody / 100 m ²	Postřik	5,6
Zelenina, Odolnost - Postřik zeleniny (rajče, paprika, okurka, celer, petržel, brambory, řepa) v době růstu zelené hmoty rostlin, u rajčat, okurek, aj. před květem. Max. 1x za vegetaci.	5 - 10 ml / 10 l vody / 100 m ²	Postřik	5,6